

Antihelmínticos para PERROS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Edad y pesos mínimos de tratamiento | Espectro de acción (helminfos gastrointestinales) | | |
|--|------------------------------------|---|------------------------|---|---|----------------|---------------------------|
| | | | | | Nematocida | Cestocida | Preventivo dirofilariosis |
| Advocate® (Bayer) | Moxidectina + Imidacloprid | 2,5 mg/kg y 10 mg/kg respectivamente | Spot on | 7 semanas | Sí | - | Sí |
| Canex® (Pfizer) | Pirantel pamoato | - | Pasta Oral / Tableta | - | Sí | - | - |
| Canitenol-BT (Syva) | Praziquantel | 50 mg/10 kg | Comprimido | - | - | Sí | - |
| Cardotek-30®Plus (Merial) | Ivermectina + Pirantel | 6 µ/kg y 5 mg/kg respectivamente al mes | Tableta masticable | 6 semanas | Sí | - | Sí |
| Cestem® Sabor (Ceva) | Febantel + Pirantel + Praziquantel | - | Comprimido | No en las primeras semanas de gestación | Sí | Sí | - |
| Dolpac® (Vetoquinol) | Oxantel + Pirantel + Praziquantel | - | Comprimido | No durante la gestación y la lactancia | Sí | Ta, Di | - |
| Dosalid (Pfizer) | Epsiprantel + Pirantel | 5,5 mg/kg y 5 mg/kg respectivamente | Comprimido | 4 semanas; no durante la gestación | Sí | Ta, E, Di | - |
| Droncid (Bayer) | Praziquantel | 5,68 mg/kg (IM o SC) / 5ml/kg | Inyectable/ Comprimido | No en cachorros destetados | - | Ta, E, Di, Mes | - |
| Drontal® suspensión oral (Bayer) | Febantel + Pirantel | 15 mg/kg y 5 mg/kg respectivamente | Suspensión oral | 15 días y 0,6 kg | Sí | - | - |
| Drontal® Plus Sabor (Bayer) | Febantel + Pirantel + Praziquantel | 1 comp/10 kg o 35 kg (según presentación) | Comprimido | - | Sí | Ta, E, Di, Mes | - |
| Guardian® SR Inyectable (Elanco) | Moxidectina | 0,05 ml/kg | Inyectable | 12 semanas | Sí | - | Sí |
| Immiticide (Merial) | Milbemicina oxima | 0,5 mg/kg | Inyectable | No durante la gestación | Sí | - | Tratamiento |
| Interceptor® (Novartis) | Melarsamina diclorhidrato | 2,5 mg/kg | Comprimido | A partir de 2 semanas | Sí | - | Sí |
| Levofarco® (Farco Veterinaria) | Levamisol (clorhidrato) | 1 ml/10 kg | Inyectable | - | Sí | - | - |

Ta: *Taenia* spp E: *Echinococcus granulosus*
Di: *Diphylidium caninum* Mes: *Mesocestoides* spp



Antihelmínticos para PERROS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Edad y pesos mínimos de tratamiento | Espectro de acción (helminthos gastrointestinales) | | |
|--------------------------------------|------------------------------------|---|-------------------------------|--|--|----------------|---------------------------|
| | | | | | Nematocida | Cestocida | Preventivo dirofilariosis |
| Milbemax® (Novartis) | Milbemicina oxima + Praziquantel | 0,5 mg/kg y 5 mg/kg respectivamente | Comprimido masticable | 5 kg | Sí | Sí | - |
| Panacur® (MSD) | Fenbendazol | 50 mg/kg | Pasta oral | No durante 40 primeros días de gestación | Sí | No | - |
| Panacur® (MSD) | Fenbendazol | Según presentación de 250 o 500 y días de tratamiento | Comprimidos | No durante 40 primeros días de gestación | Sí | Ta | - |
| Piperacina Maymó (Bayer) | Piperacina citrato | - | Suspensión oral | 4 semanas | Sí | - | - |
| Plerion® | Oxantel + Pirantel + Praziquantel | - | Comprimido masticable | 2 meses | Sí | Sí | - |
| Procox® (Bayer) | Emodepside + Toltrazurilo | 0,9 mg/ml emodepside + 18 mg/ml toltrazurilo | Suspensión oral | 15 días y 4 kg | Sí | - | - |
| Profender® (Bayer) | Praziquantel + Emodepside | 5 mg/kg y 1 mg/kg respectivamente | Comprimido | 12 semanas y/o 1 kg | Sí | Sí | - |
| Program® Plus (Novartis) | Milbemicina oxima + Lufenurón | 0,5 mg/kg y 10 mg/kg respectivamente | Comprimido | 2 semanas y/o 1 kg | Sí | - | Sí |
| Stronghold (Pfizer) | Selamectina | 6 mg/kg mes | Spot on | 6 semanas | Sí | - | Sí |
| Telmin® (Esteve) | Mebendazol | - | Comprimidos / suspensión oral | - | Sí | Ta, E | - |
| Teniciven® (Fatro Iberica) | Praziquantel | - | Comprimidos/inyectable | - | - | Ta, E, Di, Mes | - |
| Vitaminthe® (Virbac) | Oxibendazol + Niclosamida | 0,625 ml/kg | Pasta oral | - | Sí | Ta | - |
| Zipyran® (Calier) | Praziquantel | 5 mg/kg | Comprimido | - | No | Ta, E, Di | - |
| Zipyran Plus® (Calier) | Praziquantel + Pirantel + Febantel | 5 mg/kg, 5 mg/kg y 15 mg/kg respectivamente | Comprimido | No durante 4 primeras semanas de gestación | Sí | Ta, E, Di | - |

Ta: *Taenia* spp **E:** *Echinococcus granulosus*
Di: *Diphylidium caninum* **Mes:** *Mesocestoides* spp



Antihelmínticos para GATOS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Rango de dosis/posología | Forma farmacéutica | Edad y pesos mínimos de tratamiento | Espectro de acción (helmintos gastrointestinales) | | |
|------------------------------------|-------------------------------------|---|---------------------------------------|-------------------------------------|---|---|---------------------------|
| | | | | | Nematocida | Cestocida | Preventivo dirofilariosis |
| Advocate® (Bayer) | Moxidectina + Imidacloprid | 10 mg/kg y 1 mg/kg respectivamente | Spot on | 9 semanas | Sí | - | Sí |
| Canex® (Pfizer) | Pirantel pamoato | 10 mg/kg | Comprimido / Pasta oral | - | Sí | - | - |
| Canitenol-BT (Syva) | Praziquantel | 5 mg/kg | Comprimido | - | - | Sí | - |
| Droncit® (Bayer) | Praziquantel | 5,68 mg/kg (IM o SC) / 5 mg/kg | Inyectable / Comprimido | No en gatitos destetados | - | Ta, E, Di, Mes | - |
| Drontal® (Bayer) | Pirantel + Praziquantel | 57,5 mg/kg y 5 mg/kg respectivamente | Comprimido | < 1kg | Sí | Ta, E, Di, Mes, <i>Joyeuxiella pasqualei</i> | - |
| Flubenol® Gatos (Esteve) | Flubendazol | 22 mg/kg día | Pasta oral | - | Sí | Ta | - |
| Milbemax® (Novartis) | Milbemicina Oxima + Praziquantel | 2 mg/kg y 5 mg/kg respectivamente | Comprimido / Comprimido recubierto | 6 semanas y/o 0,5 kg ; 2 kg | Sí | Sí | Sí |
| Panacur® (MSD) | Fenbendazol | 50-100 mg/kg | Comprimido / Pasta oral | No en gatas gestantes | Sí | Ta | - |

Ta: *Taenia* spp **E:** *Echinococcus granulosus*

Di: *Diphylidium caninum* **Mes:** *Mesocestoides* spp



Antihelmínticos para GATOS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Rango de dosis/posología | Forma farmacéutica | Edad y pesos mínimos de tratamiento | Espectro de acción (helmintos gastrointestinales) | | |
|--------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|---|----------------|---------------------------|
| | | | | | Nematocida | Cestocida | Preventivo dirofilariosis |
| Piperacina Maymó (Maymó) | Piperacina citrato | 100-150 mg/kg | Suspensión oral | 4 semanas | Sí | - | - |
| Profender® (Bayer) | Emodepside + Praziquantel | 3 mg/kg y 12 mg/kg respectivamente | Spot on | 8 semanas y 0,5 kg | Sí | Sí | - |
| Stronghold (Pfizer) | Selamectina | 6 mg/kg mes | Spot on | 6 semanas | Sí | - | Sí |
| Telmin®Unidía (Esteve) | Mebendazol | 20 mg/kg | Comprimido/ Suspensión oral | - | Sí | Ta, E | - |
| Teniciven® (Fatro Iberica) | Praziquantel | 5,68 mg/kg / 5 mg/kg | Comprimido/ Inyectable | No en gatitos destetados | - | Ta, E, Di, Mes | - |
| Vitaminthe (Virbac) | Oxibendazol + Niclosamida | 0,625 ml/kg | Pasta oral | - | Sí | Ta | - |
| Zipyran (Calier) | Praziquantel | 5 mg/kg | Comprimido | - | - | Ta, E, Di, Mes | - |

Ta: *Taenia* spp **E:** *Echinococcus granulosus*

Di: *Diphylidium caninum* **Mes:** *Mesocestoides* spp




Antiparasitarios externos para PERROS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Espectro de actividad | | | | | | | | | | |
|----------------------------------|--------------------------------|--|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|---|
| | | | | Pulgas | Garrapatas | Piojos ¹ | Otros | Ácaros de la sarna | Mosquitos | Flebotomos | Mosca de los establos | Tratamiento DAPP ³ | Parásitos intestinales | |
| Activyl® (MSD) | Indoxacarb | 15 mg/kg | Spot on | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - | |
| Advantix® (Bayer) | Imidacloprid + Permetrina | 10 mg/kg y 50 mg/kg respectivamente | Spot on | Sí | Sí + repelente | Sí | - | - | - | Repelente | Repelente | Repelente | Sí | - |
| Advocate® (Bayer) | Imidacloprid + Moxidectina | 10 mg/kg y 2,5 mg/kg respectivamente | Spot on | Sí | - | Sí | <i>O. cynotis/ D. immitis/ A. vasorum</i> | Sí | - | - | - | Sí | Nematodos | |
| Barricade® (Esteve) | Cipermetrina | 1 ml / 1 L agua | Emulsión tópica | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - | - |
| Bolfo® Spray (Bayer) | Propoxur | 1 vez / semana | Spray | Sí | Sí + repelente | Sí | - | - | - | - | - | Repelente | - | - |
| Bolfo® Collar (Bayer) | Propoxur | Collar / 4 meses | Collar | Sí | Sí + repelente | Sí | - | - | - | - | - | Repelente | - | - |
| Caspstar® (Novartis) | Nitenpiram | 1 mg/kg | Comprimido | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Certifect™ (Merial) | Fipronil + Metopreno + Amitraz | 1 vez / mes | Spot on | Sí | Sí | Sí | Reduce el riesgo de transmisión de enf. transmitidas por garrapatas | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Comfortis® (Elanco) | Espinosad | 1 vez / mes | Oral | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Defendog® (Virbac) | Permetrina | 100 mg/kg | Solución tópica | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Effipro® (Virbac) | Fipronil | 7,5-15 mg/kg | Spot on/ Spray | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Eliminall® (Pfizer) | Fipronil | 1 vez / 2 meses | Spot on | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Exspot™ (MSD) | Permetrina | 1 ml para < 15 kg 2 ml para > 15 kg | Spot on | Sí | Sí | Sí | - | - | - | Repelente | Repelente | - | - | - |
| Frontline combo® (Merial) | Fipronil + (S)Metopreno | 6,7 mg/kg y 6 mg/kg respectivamente | Spot on | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Frontline® (Merial) | Fipronil | 7,5-15 mg/kg 6,7 mg/kg | Spray / Spot on | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Kawu® (Calier) | Diazinón | 1 collar / 4 meses | Collar | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Masticadores

² IDI: Inhibidor del desarrollo de insectos

³ DAPP: estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas.



Antiparasitarios externos para PERROS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Espectro de actividad | | | | | | | | | |
|---|----------------------------------|-------------------------|--------------------|-----------------------|------------|---------------------|---|--------------------|-----------|------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Pulgas | Garrapatas | Piojos ¹ | Otros | Ácaros de la sarna | Mosquitos | Flebotomos | Mosca de los establos | Tratamiento DAPP ³ | Parásitos intestinales |
| Natura [®] (Virbac) | Permetrina | 1 collar / 4 meses | Collar | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Prac-tic [®] (Novartis) | Piriprol | 12,5 mg/kg | Spot on | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Prevender [®] (Virbac) | Diazinón | 1 collar / 6 meses | Collar | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preventer [®] (Virbac) | Diazinón | 1 collar / 5 meses | Collar | Sí | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Preventic [®] (Virbac) | Amitraz | 1 collar / 4 meses | Collar | - | Sí | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program [®] (Novartis) | Lufenurón | 10 mg/kg | Comprimido | IDI ² | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Program [®] Plus (Novartis) | Lufenurón + Milbemicina oxima | 10 mg/kg + 0,5 mg/kg | Comprimido | IDI ² | - | - | <i>D. immitis,</i> <i>A. vasorum</i> | - | - | - | - | - | Sí |
| Promeris [®] Duo (Pfizer) | Metaflumizona + Amitraz | 20 mg/kg para ambos | Solución tópica | Sí | Sí | Sí | - | - | - | - | - | Sí | - |
| Seresto [®] (Bayer) | Imidacloprid + Flumetrina | 1 collar / 8 meses | Collar | Sí + Repelente | Sí | Sí | - | Sarcóptica | - | - | - | Sí | - |
| Scalibor [®] Collar (MSD) | Deltametrina | 1 collar / 4 o 6 meses | Collar | Sí | Sí | - | - | - | Sí | Sí | - | - | - |
| Stockade [®] (Esteve) | Permetrina | 5 mg/kg | Aerosol | Sí | - | Sí | - | - | Sí | Sí | Sí | - | - |
| Stronghold [®] (Pfizer) | Selamectina | 6 mg/kg mes | Spot on | Sí | - | - | <i>O. cynotis</i> | Sí | - | - | - | Sí | Nematodos |
| Supona [®] (Pfizer) | Clorfenvinfos | 1 ml / 1 L agua | Emulsión tópica | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - | - | Sí | - | - |
| Taberdog [®] (Divasa-Farmavic) | Permetrina | 1 collar / 4 meses | Collar | Sí | Sí | Sí | - | - | Repelente | - | Repelente | - | - |
| Zotalin [®] (Zotal) | Diazinón | 1 collar / 4 meses | Collar | Sí | Repelente | - | - | - | - | - | - | - | - |

¹ Masticadores

² IDI: Inhibidor del desarrollo de insectos

³ DAPP: estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas.



Antiparasitarios externos para GATOS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Espectro de actividad | | | | | |
|---------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Pulgas | Garrapatas | Piojos ¹ | Otros | Tratamiento DAPP ³ | Parásitos intestinales |
| Activyl® (MSD) | Indoxacarb | 25 mg/kg | Spot on | Sí | - | - | - | Sí | - |
| Advantage® (Bayer) | Imidacloprid | 10 mg/kg | Spot on | Sí | - | - | - | Sí | - |
| Advocate® (Bayer) | Imidacloprid + Moxidectina | 10 mg/kg y 1 mg/kg respectivamente | Spot on | Sí | - | Sí | <i>O. cynotis, D. immitis</i> | - | Nematodos |
| Barricade® (Esteve) | Cipermetrina | 1 ml / 1 L agua | Emulsión tópica | Sí | Sí | Sí | - | - | - |
| Bolfo Spray® (Bayer) | Propoxur | 1 vez / semana | Spray | Sí | Sí + repelente | Sí | - | - | - |
| Bolfo® Collar (Bayer) | Propoxur | Collar / 4 meses | Collar | Sí | Sí + repelente | Sí | - | - | - |
| Capstar® (Novartis) | Nitenpiram | 1 mg/kg | Comprimido | Sí | - | - | - | - | - |
| Effipro® (Virbac) | Fipronil | 7,5-15 mg/kg | Spot on / Spray | Sí | Sí | Sí | - | - | - |

¹ Masticadores

² IDI: Inhibidor del desarrollo de insectos

³ DAPP: estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas.



Antiparasitarios externos para GATOS disponibles en España (2012)

| Nombre comercial | Principios activos | Posología | Forma farmacéutica | Espectro de actividad | | | | | |
|-------------------------------------|---------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|----------------|---------------------|-------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | Pulgas | Garrapatas | Piojos ¹ | Otros | Tratamiento DAPP ³ | Parásitos intestinales |
| Eliminall® (Pfizer) | Fipronil | 1 vez / 2 meses | Spot on | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Frontline Combo® (Merial) | Fipronil + (S)-metopreno | 5 mg/kg y 6mg/kg respectivamente | Spot on | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - |
| Frontline® (Merial) | Fipronil | 7,5-15 mg/kg 6,7 mg/kg | Spray / Spot on | Sí | Sí | Sí | - | Sí | - |
| Kawu® (Calier) | Diazinón | 1 collar / 4 meses | Collar | Sí | - | - | - | - | - |
| Preventef® (Virbac) | Diazinón | 1 collar / 5 meses | Collar | Sí | Sí | - | - | - | - |
| Program® (Novartis) | Luferunón | 10 mg/kg y 30 mg/kg | Inyectable /ampolla bebible | IDI ² | - | - | - | - | - |
| Promeris® (Pfizer) | Metaflumizona | 1 vez / mes | Spot on | Sí | Sí | Sí | - | - | Sí |
| Seresto® (Bayer) | Imidacloprid + Flumetrina | 1 collar / 8 meses | Collar | Sí | Sí + Repelente | Sí | - | Sí | - |
| Stronghold® (Pfizer) | Selamectina | 6 mg/kg mes | Spot on | Sí | - | - | Sarna | Sí | Nematodos |

¹ Masticadores

² IDI: Inhibidor del desarrollo de insectos

³ DAPP: estrategia de tratamiento para el control de dermatitis por alergia a las picaduras de pulgas.

